

## 症状観察用語集

..... ( Terminology for cage-side observation in animals )

Code	局 所 的 症 状	解 説
S	肛門性器部 Anogenital region	
S 01	陰茎突出 嵌頓包茎 Prolapse of penis Paraphimosis	皮輪ないし包皮口の狭窄のため、陰茎が包皮腔内に還納不能となった状態。嵌頓包茎ともいう。陰茎突出により包皮、陰茎の腫れ、壊死あるいは外傷もまれにみられる。 マウス、ラット 程度
S 02	射精分泌物 Ejaculatory discharge	性腺からの分泌物（射精物）。色調、量、性状を観察する。ラットではケージのトレイ、サルでは被毛附着物をみる。サルでは自慰行動もまれにみられる。尿路系疾患による分泌物と識別する。 マウス、ラット、狢 程度、性状
S 03	精巣下降 Testicular descent	正常のマウス、ラットでは生後5週までに完了する。幼若ラット、マウスの毒性試験（一般には生殖毒性試験）を実施する場合に観察する。 マウス、ラット
S 04	発情性変化 外陰部腫張 Estrus sign Swelling of vulva	雌の外陰部が腫脹し、膣から出血が見られる。イヌは年1～2回発情する。発情持続期間は2週間以内。ピグル犬では通常9～11ヶ月齢で見られる。 イヌ
S 05	月経 Menses Menstruation	霊長類の膣から出血。成熟した雌の子宮粘膜より起こる周期的出血で、この際子宮粘膜も基底層を残して離脱するので血液と混じって外性器より排泄される。通常サルは3歳以上でみられる。1～1.5ヶ月に1回見られる。 狢
S 06	膣分泌物 Vaginal discharge	膣からの分泌物であるが、発情血（イヌ）、月経血（サル）と区別する。 マウス、ラット、ウサギ、イヌ、狢 程度、性状
S 07	泌尿・生殖器 出血 Urogenital hemorrhage Urogenital bleeding	泌尿器および生殖器からの出血。泌尿器あるいは生殖器系の炎症および腫瘍などによってみられることがある。発情血（イヌ）、月経血（サル）と区別する。 マウス、ラット、ウサギ、イヌ、狢 程度
S 08	膣口出血 Vaginal hemorrhage Vaginal bleeding	膣からの出血。外傷あるいは流産（胎盤剥離、子宮破裂）などによってみられることがある。発情血（イヌ）、月経血（サル）と区別する。 マウス、ラット、ウサギ、イヌ、狢 程度
S 09	膣脱 Colpoptosis Colpoptosia	膣が脱出あるいは下降し外部に出ている状態。 マウス、ラット、ウサギ、イヌ、狢 程度

Code	局 所 的 症 状	解 説
S 10	下腹部の汚れ 会陰部周囲 の汚れ 肛門周囲の 汚れ .....	Soiled perineal region - 失禁、下痢、軟便、血液等により下腹部の汚れた状態。 マウス、ラット、ウサギ、豚、サル 程度
S 11	脱肛 .....	Prolapse of anus ----- 肛門が外部に突出した状態。老齢の動物において稀に見られることがある。 豚、サル 程度