

安全に
使うための

どつ かつ かつ こん とう 獨活葛根湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に獨活葛根湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

↓ いいえ

はい

服用できません

□今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？

□日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？

□妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

↓ すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

□以前に麻黄を含む漢方薬 ** を服用して、気持ちが悪くなったり、動悸がしたり、尿が出にくくなったりしたことがありますか？

□以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

↓ すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

次のような症状がありますか？

□四十肩、五十肩

□寝ちがえ

□肩こり

↓ 1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

□心臓に不具合はありますか？

□血圧はひどく高いですか？

□（男性の方）尿の出に不具合がありますか？

□胃腸が弱いですか？

□汗をかきやすいですか？

↓ すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

平素の体力は充実していますか？またはひどく虚弱ですか？

↓ 中等度／やや虚弱

ひどく虚弱／充実

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれません
が、あなたの意思により服用可能です



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

** 該当する商品がわからない場合は、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

効能・効果

体力中等度又はやや虚弱なものの次の諸症: 四十肩、五十肩、寝ちがえ、肩こり

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例 *

	シジラック /小林製薬	独活葛根湯エキス細粒G 「コタロー」 /小太郎漢方製薬		独活葛根湯 エキス錠クラシエ /クラシ工薬品
--	----------------	-----------------------------------	--	------------------------------

* 個々の商品については、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

使用上の注意

してはいけないこと

次の人には服用しないこと

生後 3 カ月未満の乳児。

相談すること

1. 次の人には服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことのある人。
- (8) 次の症状のある人。 むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 3. 1 カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

葛根、桂皮、芍藥、麻黃、独活、生姜、地黃、大棗、甘草

独活葛根湯の体力分類に対する適応度 (服用される方の普段の体力でお考えください)

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
0	2	2	0	0

2: 最適、1: 適応可能、0: 原則としては適さない