

安全に  
使うための

はんげこうぼくとう

# 半夏厚朴湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に半夏厚朴湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？  
 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

次のような症状がありますか？

- |                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 不安神経症      | <input type="checkbox"/> 神経性胃炎   |
| <input type="checkbox"/> つわり        | <input type="checkbox"/> せき      |
| <input type="checkbox"/> しわがれ声（声がれ） | <input type="checkbox"/> のどのつかえ感 |

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません\*

平素の体力は虚弱ですか？

中等度／充実

虚弱

- 気分が落ち込んだ感じや、ふさいだ感じがしますか？  
 のどや、のどの奥にものがつまった感じがありますか？  
 めまいや吐き気がありますか？  
 胃腸が弱いですか？

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です



服用できます

\* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

つわりに使用する場合には、5～6日間が目安です。

症状がよくなる場合は、医師、薬剤師、または登録販売者に相談してください。

## 効能・効果

体力中等度をめやすとして、気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症：  
不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声、のどのつかえ感

## 日本漢方生薬製剤協会による主な商品例\*

NO IMAGE	ウチダの理気利心 ／ウチダ和漢薬	 「クラシエ」漢方半夏厚朴湯 エキス顆粒 ／クラシエ薬品	 阪本漢法の半夏厚朴湯顆粒 ／阪本漢法製薬	 JPS漢方顆粒-39号 ／ジェーピーエス製薬
 16 ツムラ漢方半夏厚朴湯 エキス顆粒 ／ツムラ	NO IMAGE	トチモトの半夏厚朴湯 ／栃本天海堂	NO IMAGE	ハイ・コーミン ／大杉製薬
 ハンゲコーン「コタロー」 ／小太郎漢方製薬		ホノミアンセイ錠 ／劑盛堂薬品		 半夏厚朴湯Aエキス細粒 「分包」三和生薬 ／三和生薬

\*個々の商品については、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

## 使用上の注意

### してはいけないこと

次の人は服用しないこと  
生後3ヵ月未満の乳児。

### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1ヵ月位（つわりに服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 処方構成生薬

半夏、茯苓、厚朴、蘇葉、生姜

## 半夏厚朴湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
0	1	2	1	0

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない