



りょう けい じゅつ かん とう

苓桂朮甘湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に苓桂朮甘湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

いいえ

はい

次のような症状がありますか？
 立ちくらみ めまい・ふらつき 頭痛
 耳鳴り 動悸・息切れ 神経過敏
 神経症（発作性ののぼせや動悸）

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

心臓に不具合はありますか？
 腎臓に不具合はありますか？
 血圧はひどく高いですか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

平素の体力は充実していますか？または虚弱ですか？

中等度／虚弱

充実

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です

めまいやふらつきを感じることはありますか？
 のぼせや動悸を感じることはありますか？

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」



* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

効能・効果

体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるものの次の諸症：立ちくらみ、めまい、頭痛、耳鳴り、動悸、息切れ、神経症、神経過敏

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例*

NO IMAGE	ウチダの苓桂朮甘湯 エキス散 ／ウチダ和漢薬	 「クラシエ」漢方苓桂朮甘湯 エキス顆粒 ／クラシエ薬品	 神農苓桂朮甘湯エキス錠 ／ジェーピーエス製薬	 ツムラ漢方苓桂朮甘湯 エキス顆粒 ／ツムラ
 天祐	天祐（エキス顆粒） ／建林松鶴堂	NO IMAGE	トチモトの苓桂朮甘湯 ／栃本天海堂	 ホノミキジウ錠 ／劑盛堂薬品
NO IMAGE	苓桂朮甘湯錠OM ／大峰堂薬品工業	 レイジツトN「コタロー」 ／小太郎漢方製薬		 苓桂朮甘湯Aエキス細粒 「分包」三和生薬 ／三和生薬

*個々の商品については、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感 やこわばりに加えて、脱力感、筋肉 痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

茯苓、白朮または蒼朮、桂皮、甘草

苓桂朮甘湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
1	2	1	0	0

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない