

TDS (Total Diet Study)

地域	年	microg/日	
沖縄	2002	84,29	
沖縄	2001	105,5	
福岡	H3	27-376	うち無機5.7%、MAA 3.6%、DMAA27.3%、TMA 47.9%
カナダ・ハリファクス	1986?	6,6	
カナダ・モントリオール	1986?	35,35	
カナダ・トロント	1986?	13,93	
カナダ・ウィニペグ	1986?	12,9	
カナダ・バンクーバー	1986?	9,11	
カナダ・全体	1986?	16,69	
カナダ	1973	30	
USA	1975	7	
USA	1984	45	
USA	1985	62	
USA	1979	13-16	
UK	1984	89	
ベルギー	1983	12	
オランダ	1984	200	
オランダ	1984	15	
オーストリア	1977	27	
ニュージーランド	1978	55	
デンマーク	1990	114	
スペイン・バスク	1990-91	286	
ブラジル	1992	12,4	子ども(平均5.1才)
ブラジル	1992	6,9	老人(平均84才)
日本	1981-1994	120-230	そのうち50-60%が魚
愛知県	S59-62	92±89.4	
山梨県	1981-90	61.9-421, 平均225	全国平均の二倍ほど、年々増加、海藻・魚介類由来
沖縄	1991-2000	98-263	
沖縄	2000	110,1	
香川	1985-2001	79-356	
ベルギー	1982	11,5	
オランダ	1976-78	15	
インド	1993-94	~10	
クロアチア共和国	1988-1993	11,7	
カナダ	1985-	38,1	
日本(滋賀県)	1991	260	陰膳方式
日本(滋賀県)	1992	210	陰膳方式
日本(滋賀県)	1991	160	マーケットバスケット方式
日本(滋賀県)	1992	280	マーケットバスケット方式
日本(滋賀県)	1993-94	85	食堂のランチ一食
日本(滋賀県)	1993-94	91	お弁当一食
アメリカ	1986-91	38,6	
アメリカ	1967	68	
アメリカ	1968	137	
アメリカ	1969	75	
アメリカ	1970	57	
アメリカ	1971	17	
アメリカ	1972	12	
アメリカ	1973	10	

本サイトのデータは、Taylor and Francisのご厚意により、下記の論文からの掲載許可を得て収載しています。

※Arsenic in various foods:Cumulative data  
C. Uneyama, M. Toda, M. Yamamoto, K. Morikawa  
Food Additive Contam 2007 24(5) 447-534.  
(国立衛研)

TDS(Total Diet Study)

地域	年	microg/日	
アメリカ	1974	21	
メリーランド	1995-96	27,82	
フランス	1998-99	109	
イギリス	1976	75	
イギリス	77	100	
イギリス	78	81	
イギリス	1982	90	
イギリス	83	70	
イギリス	91	70	
イギリス	94	63	
イギリス	97	65	
アメリカ	1991-97	2.15-92.1	年齢・性別
スペイン	2002?	221,18	
フランス	2000?	147	
インド	2000?	171.20-189.13	成人
インド	2000?	91.89-101.63	子ども
メキシコ		38.5-394	low and high,飲料水中濃度が高い 412microg/lため総摂取量は56- 1220microg/dayになる
チリ	1999	66	飲料水(0.572microg/mL)を含めると
チリ	1999	38	飲料水(0.041microg/mL)を含めると
スペイン	2000	132-223.59	性・年齢別
インド	2001?	588-658	地下水にヒ素汚染有り
フランス	1998-99	109	
スペイン	1990-91	286	
オランダ	1984-86	38	
フィンランド		58	
英国	1994	63	
ベルギー		45	
ベルギー	2002?	265	
デンマーク	2002?	64	
フィンランド	2002?	15	
フランス	2002?	148	
ドイツ	2002?	37	
ギリシャ	2002?	0,5	魚の数値が低すぎる
アイルランド	2002?	0,98	
イタリア	2002?	309	
ポルトガル	2002?	0,001	ミネラルウォーターの値しかない
スウェーデン	2002?	101	
英国	2002?	65,8	
英国	1999	50	無機のみでは0.9-5
ベルギー	1992	<30	国内4カ所、最大766
日本	1993-94	0-383,平均85-91	ランチー食分
米国5大湖付近		平均21(成人) 7.1 (子ども)	
オランダ		38	
西ドイツ子ども		8,821	5-8 才
ドイツ	1995	2.31、0.89-6.75	1.5-5.5才
フランス	2000	62	
チリ	2001-2002	77	
バングラデシュ	1998	214	男性食品由来

本サイトのデータは、Taylor and Francisのご厚意により、  
下記の論文からの掲載許可を得て収載しています。

※Arsenic in various foods:Cumulative data  
C. Uneyama, M. Toda, M. Yamamoto, K. Morikawa  
Food Additive Contam 2007 24(5) 447-534.  
(国立衛研)

TDS(Total Diet Study)

地域	年	microg/日	
バングラデシュ	1998	120	女性食品由来
バングラデシュ	1998	460	男性水由来
バングラデシュ	1998	395	女性水由来
日本	1975	120	
米国	1976	66,5	
スペイン	2003	458	
ドイツ	1995	6,9	子ども
オランダ	1982-83	38	
米国	1995-96	20,6	
フィンランド	1985	39	18才
ブラジル	1996	16.7-145	地域により違う

本サイトのデータは、Taylor and Francisのご厚意により、  
下記の論文からの掲載許可を得て収載しています。

※Arsenic in various foods:Cumulative data  
C. Uneyama, M. Toda, M. Yamamoto, K. Morikawa  
Food Additive Contam 2007 24(5) 447-534.  
(国立衛研)