

安全に
使うための

おう れん げ どく とう

黄連解毒湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に黄連解毒湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

次のような症状がありますか？

- 鼻血
- 不眠症
- 胃炎
- 神経症（いらいらして落ち着かない）
- 二日酔
- 月経や出産に伴う体調不良
- めまい・ふらつき
- 動悸
- 更年期障害
- 湿疹・皮膚炎
- 皮膚のかゆみ
- 口内炎

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

平素の体力は充実していますか？

中等度／充実

虚弱

- のぼせ気味ですか？
- 顔色が赤いですか？
- いらいらして落ち着かないことがありますか？

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

鼻血、二日酔に使用する場合には、5～6回まで服用しても症状がよくなる時は、医師、薬剤師、または登録販売者に相談してください。

効能・効果

体力中等度以上で、のぼせがみで顔色赤く、いらいらして落ち着かない傾向のあるものの次の諸症：鼻出血、不眠症、神経症、胃炎、二日酔、血の道症、めまい、動悸、更年期障害、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ、口内炎

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例*

 ウチダの黄連解毒丸 ／ウチダ和漢薬	 オウゲEP錠 ／劑盛堂薬品	 オウゲインN「コタロー」 ／小太郎漢方製薬	 黄連解毒湯Aエキス細粒 「分包」三和生薬 ／三和生薬
 黄連解毒湯エキス散 〔勝昌〕 ／東洋薬行	NO IMAGE オースギコーミン ／大杉製薬	 「クラシエ」 漢方黄連解毒湯エキス顆粒 ／クラシエ薬品	NO IMAGE JPS黄連解毒湯 エキス錠N ／ジェーピーエス製薬
 ツムラ漢方黄連解毒湯 エキス顆粒A ／ツムラ	NO IMAGE トチモトの黄連解毒湯 ／栃本天海堂	NO IMAGE 花扇黄解丸 ／小西製薬	

*個々の商品については、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

- 1ヵ月位（鼻出血、二日酔に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期服用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

黄連、黄芩、黄柏、山梔子

黄連解毒湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
0	0	1	2	2

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない