

安全に
使うための

くふうげどくさん 駆風解毒散の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に駆風解毒散を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

いいえ

はい

次のような症状がありますか？

- のどの腫れ
- のどの痛み
- 扁桃（へんとう）炎、扁桃（へんとう）周囲炎

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

- 胃腸が弱いですか？
- 下痢をしやすいですか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

5～6回服用しても症状がよくなる場合は、医師、薬剤師、または登録販売者に相談してください。

効能・効果

体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛むものの次の諸症：扁桃炎、扁桃周囲炎

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例*

 駆風解毒散エキス (細粒) 79 ／松浦薬業	 駆風解毒湯Aエキス細粒 「分包」三和生薬 ／三和生薬	NO IMAGE	サトウ駆風解毒湯 エキス顆粒 ／佐藤製薬	 JPS漢方顆粒-60号 ／ジェービーエス製薬
NO IMAGE	トチモトの駆風解毒湯 ／栃本天海堂			

*個々の商品については、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感 やこわばりに加えて、脱力感、筋肉 痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

防風、牛蒡子、連翹、荊芥、羌活、甘草、桔梗、石膏

駆風解毒散の体力分類に対する適応度 (服用される方の普通の体力でお考えください)

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
1	1	2	2	1

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない