

安全に
使うための

ちょう とう さん

釣藤散の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に釣藤散を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- ☐ 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- ☐ 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- ☐ 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

いいえ

はい

次のような症状がありますか？

- ☐ 慢性頭痛・頭重感
- ☐ 肩こり
- ☐ 神経症（神経が^{たか}亢ぶりやすい）
- ☐ めまい・ふらつき感
- ☐ 血圧が高め

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

冷え症ですか？

いいえ

はい

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です

平素の体力はひどく虚弱ですか？

やや虚弱／中等度以上

ひどく虚弱



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

効能・効果

体力中等度で、慢性に経過する頭痛、めまい、肩こりなどがあるものの次の諸症：慢性頭痛、神経症、高血圧の傾向のあるもの

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

一元乃錠剤釣藤散	一元製薬	釣藤散エキス細粒〔東洋〕	東洋薬行
ウチダの双鈎順気	ウチダ和漢薬	釣藤散「タキザワ」	タキザワ漢方廠
クラシエ釣藤散料エキス錠	クラシエ薬品	釣藤散料A	大杉製薬
JPS釣藤散料エキス錠N	ジェーピーエス製薬	釣藤散料エキス顆粒KM	カーヤ
真仙（エキス顆粒）	建林松鶴堂	チョウトーン「コタロー」	小太郎漢方製薬
ズッキノン	小林製薬	ツムラ漢方釣藤散エキス顆粒	ツムラ
釣藤散エキス〔細粒〕43	松浦薬業	トチモトの釣藤散	栃本天海堂

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - 胃腸虚弱で冷え症の人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

釣藤鈎、橘皮または陳皮、半夏、麦門冬、茯苓、人參、防風、菊花、甘草、生姜、石膏

釣藤散の体力分類に対する適応度（服用される方の普段の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
0	1	2	1	0

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない