

安全に
使うための

はち み じ おう がん

八味地黄丸の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に八味地黄丸（八味丸）を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- ☐ 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- ☐ 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- ☐ 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に附子を含む漢方薬**を服用して、気持ちが悪くなったり、のぼせたり、動悸がしたり、手足や舌がしびれたりしたことがありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

服用はおすすめできません*

次のような症状がありますか？

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 尿が出にくい | <input type="checkbox"/> 尿がもれる |
| <input type="checkbox"/> 残尿感がある | <input type="checkbox"/> 夜間尿 |
| <input type="checkbox"/> むくみ | <input type="checkbox"/> 腰痛 |
| <input type="checkbox"/> 関節の痛み | <input type="checkbox"/> しびれ |
| <input type="checkbox"/> かゆみ | <input type="checkbox"/> 耳鳴り |
| <input type="checkbox"/> 頭重 | <input type="checkbox"/> 冷え |

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

- ☐ 胃腸が弱いですか？
- ☐ 下痢をしやすいですか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

服用できません

- ☐ 心臓に不具合はありますか？
- ☐ 体力が充実していて暑がりですか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

服用はおすすめできません*



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

** 該当する商品がわからない場合は、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿でときに口渴があるものの次の諸症：下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）、軽い尿漏れ

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

ウチダの八味丸	ウチダ和漢薬	八味地黄丸料エキス顆粒KM	カーヤ
オオクサ八味丸	大草薬品	八味地黄丸〔東洋〕	東洋薬行
オースギ八味地黄丸 A	大杉製薬	八味地黄丸料エキス錠N「コタロー」	小太郎漢方製薬
紀伊国屋腎気丸（八味丸）	紀伊国屋漢薬局	八味地黄丸料「タキザワ」	タキザワ漢方廠
阪本漢法の八味丸300A	阪本漢法製薬	花扇八味地黄丸	小西製薬
三宝八味地黄丸	三宝製薬	ホノミカツジン錠	劑盛堂薬品
サンワロン顆粒	三和生薬	本草八味地黄丸料エキス錠-H	本草製薬
JPS八味地黄丸料エキス錠N	ジェーピーエス製薬	峰寿丸	大峰堂薬品工業
松鶴堂・八味地黄錠	建林松鶴堂	蘭州金匱腎気丸	ハッ目製薬
ツムラ漢方八味地黄丸料エキス顆粒	ツムラ	蘭州金匱腎気丸	イスクラ産業
トチモトの八味地黄丸料	栃本天海堂	リエイジ EX 錠	クラシエ薬品
八味丸ダイコー	大晃生薬	ワクナガ八味地黄丸	湧永製薬
八味地黄丸錠「創至聖」	三九製薬		

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと

- (1) 生後3ヵ月未満の乳児。
- (2) 胃腸の弱い人。
- (3) 下痢しやすい人。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
 - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

地黄、山茱萸、山薬、沢瀉、茯苓、牡丹皮、桂皮、加工ブシ

八味地黄丸の体力分類に対する適応度（服用される方の普段の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
1	2	1	0	0

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない