溶出曲線測定例

パントテン酸カルシウム・リボフラビン・塩酸ピリドキシン・ニコチン酸アミド・アスコルビン酸・硝酸チアミン顆粒

パントテン酸カルシウム　３％



溶出曲線測定例

パントテン酸カルシウム・リボフラビン・塩酸ピリドキシン・ニコチン酸アミド・アスコルビン酸・硝酸チアミン顆粒

リボフラビン　0.3%

1．有効成分名：リボフラビン　2．剤形：顆粒剤　3．含量：3mg/g

4．試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水　5．回転数：75rpm

6．界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

パントテン酸カルシウム・リボフラビン・塩酸ピリドキシン・ニコチン酸アミド・アスコルビン酸・硝酸チアミン顆粒

塩酸ピリドキシン　0.5%



溶出曲線測定例

パントテン酸カルシウム・リボフラビン・塩酸ピリドキシン・ニコチン酸アミド・アスコルビン酸・硝酸チアミン顆粒

ニコチン酸アミド　３％



溶出曲線測定例

パントテン酸カルシウム・リボフラビン・塩酸ピリドキシン・ニコチン酸アミド・アスコルビン酸・硝酸チアミン顆粒

アスコルビン酸　20%

1．有効成分名：アスコルビン酸　2．剤形：顆粒剤　3．含量：200mg/g
4．試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水　5．回転数：75rpm
6．界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

パントテン酸カルシウム・リボフラビン・塩酸ピリドキシン・ニコチン酸アミド・アスコルビン酸・硝酸チアミン顆粒

硝酸チアミン　0.3%