溶出曲線測定例

マレイン酸クロルフェニラミン 0.5mg・サリチルアミド 45mg・アセトアミノフェン 25mg・無水カフェイン 5mg 配合顆粒

マレイン酸クロルフェニラミン

1．有効成分名：マレイン酸クロルフェニラミン　2．剤形：顆粒剤　3．含量：0.5mg/g
（クロルフェニラミンマレイン酸塩）
4．試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水　5．回転数：50rpm
6．界面活性剤：使用せず



マレイン酸クロルフェニラミン 0.5mg・サリチルアミド 45mg・アセトアミノフェン 25mg・無水カフェイン 5mg 配合顆粒

サリチルアミド

1．有効成分名：サルチルアミド　2．剤形：顆粒剤　3．含量：45mg/g
4．試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水　5．回転数：50rpm
6．界面活性剤：使用せず



マレイン酸クロルフェニラミン 0.5mg・サリチルアミド 45mg・アセトアミノフェン 25mg・無水カフェイン 5mg 配合顆粒

アセトアミノフェン



マレイン酸クロルフェニラミン 0.5mg・サリチルアミド 45mg・アセトアミノフェン 25mg・無水カフェイン 5mg 配合顆粒

無水カフェイン